Cabinet Boury & Associés
Orthodontie · Laon

FICHE PRATIQUE

2 PHASE ORTHODONTIQUE ■ LES ACCESSOIRES

Mini-vis d'ancrage

mini-implant

Petite vis posée dans l'os, qui sert de point d'appui fixe pour déplacer certaines dents.



À QUOI SERT CET APPAREIL ?

La mini-vis est une petite vis en titane, posée dans l'os sous anesthésie locale. Elle sert de point d'appui fixe pour déplacer certaines dents.

- Obtenir des mouvements dentaires précis, en prenant appui sur l'os plutôt que sur d'autres dents.
- Éviter que les dents d'appui se déplacent elles aussi dans une direction non souhaitée.

Comment fonctionne-t-il ?

Un ressort, une chaînette ou un élastique relie la mini-vis aux dents à déplacer. Comme la vis ne bouge pas, la force est dirigée vers les dents choisies. La pose est rapide, sous anesthésie locale ; la mini-vis est retirée au cabinet quand elle n'est plus utile, et ce retrait est en général rapide.

Au quotidien

- Une légère sensibilité est fréquente pendant un ou deux jours après la pose.
- Ne touchez pas la mini-vis avec la langue ou les doigts : les manipulations répétées peuvent la rendre mobile.
- Si un élastique ou un ressort y est accroché, ne le retirez pas et ne le changez pas sans consigne.
- Évitez les chocs sur la zone de la mini-vis : ils peuvent irriter la gencive ou la rendre mobile.

Entretien et hygiène

- Brossez doucement autour de la mini-vis chaque jour : la gencive qui l'entoure doit rester propre pour éviter une inflammation.
- Si le cabinet l'a prescrit, utilisez le bain de bouche indiqué.

Que faire en cas de problème, questions fréquentes, à retenir : **au verso**

FICHE PRATIQUE · SUITE

Mini-vis d'ancrage (mini-implant)

Que faire en cas de problème ?

- Si la mini-vis bouge ou tombe, contactez le cabinet ; si elle est tombée, gardez-la. N'essayez jamais de la resserrer.
- En cas de rougeur importante, de gonflement ou de douleur qui persiste, contactez le cabinet.

LE CABINET **03 23 23 58 68**

À RETENIR

- Ne pas toucher la mini-vis.
- Brosser doucement autour chaque jour.
- Signaler une vis mobile, une rougeur ou une douleur.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La pose fait-elle mal ?

Elle se fait sous anesthésie locale. Une légère sensibilité est possible les jours suivants.

Combien de temps reste-t-elle en place ?

Le temps du déplacement prévu ; le praticien décide du moment du retrait.

Peut-elle se desserrer ?

Oui, une perte de stabilité est possible : elle doit être contrôlée au cabinet.

EN LIGNE

Retrouvez cette fiche sur votre téléphone

Flashez le code avec l'appareil photo.

ortholaon.fr/f/minivis

Un choc sur les dents : appelez-nous immédiatement. Malaise, vomissements, saignement qui ne s'arrête pas : 15.

Conduite à tenir : ortholaon.fr/en-cas-durgence